

# Resultaten van klinische revalidatie bij volwassenen na een beroerte

Gemiddeld cijfer voor  
behandeling kliniek

8.8

Na een beroerte revalideren patiënten soms klinisch bij Merem in Hilversum. Samen met een team van behandelaren maakt de patiënt een persoonlijk behandelplan. Het persoonlijk behandelplan is gericht op het verbeteren van de individuele hulpvraag en doelen. Vaak zijn de doelen erop gericht om in eigen omgeving weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.

66 "In welke mate verbetert het dagelijks functioneren van mensen na een beroerte na klinische revalidatie en kunnen zij terugkeren naar de eigen woonomgeving?"

## Grotere zelfstandigheid



100% van de patiënten is (redelijk) zelfstandig in zelfverzorging en mobiliteit

## Verbetering uitvoer taken

71% van de patiënten ervaart meer gemak in de uitvoer van activiteiten



## Meer tevreden



68% van de patiënten ervaart meer tevredenheid over de uitvoer van activiteiten

## Weer naar huis

95% van de patiënten woont na ontslag weer in de eigen woonsituatie



Na de klinische revalidatiebehandeling functioneren de meeste mensen na een beroerte zelfstandiger en ervaren zij een verbetering in de uitvoer en tevredenheid van dagelijkse activiteiten. Het grootste deel van de mensen kan na de klinische revalidatie weer thuis wonen.

Lees [hier](#) meer over de revalidatiebehandeling na een beroerte.